



## Acer saccharinum 'Asplenifolium'



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Высота                             | 20 m   |
| Ширина                             | 14-16m   |
| Крона                              | round to fan-shaped, half-open crown   |
| Кора и ветви                       | grey and smooth  |
| Лист                               | palmate, lobes deeply dissected, bright green, 8 - 14 cm, autumn colour yellow |
| Осенний окрас                      | желтый   |
| Цветы                              | green-yellow, inconspicuous, March   |
| Плоды                              | winged nutlets, 4 - 5 cm long  |
| Колючки/шипы                       | None   |
| Ядовитость                         | неядовитый, обычно   |
| Вид почвы                          | both wet and dry soil, tolerates paved surfaces                                |
| Влажность почвы                    | устойчив к коротким наводнениям, устойчив к длительным наводнениям             |
| Мощение                            | устойчив к частичному мощению  |
| Зона зимостойкости                 | 4 (-34,4 до -28,9 °C)  |
| Устойчивость к ветру               | moderate to poor   |
| Прочие виды устойчивости           | устойчив к морозам, зона 1 - 6   |
| Дерево-среда обитания для животных | устойчив к морозам, зона 1 - 6, медонос  |
| Применение                         | аллеи и широкие улицы, промышленные зоны                                       |
| Форма                              | штамбовое дерево, многоствольное дерево  |
| Происхождение                      | De Bie van Aalst, Zundert, Netherlands, 1925                                   |

Large tree with a wide fan-shaped to round crown. The upright, loose branches spread out widely. Height and spread circa 20 m. The unfurling leaf is bronze coloured. In summer it is bright green with a grey-white underside. It is deeply 5-lobed, 8 - 14 cm. The lobes of the leaf spread less widely and are less deeply cut than of the cv. 'Laciniatum Wieri'. Autumn colour is yellow. Flowers emerge before the leaves. Shallow rooting with strongly branching roots and fibrous rootlets. The main roots may push up the hard surface. Tolerant to moist soils. Often applied as a street tree, but, due to branches breaking easily, caused by wind, it is now increasingly applied as a park tree. Winter hardiness zone: 4