



Fraxinus angustifolia 'Raywood'



Высота	15 - 20 m
Ширина	8-12m
Крона	wide ovoid to round, half-open crown
Кора и ветви	at a mature age deeply furrowed
Лист	odd-pinnate, 9 - 13 leaflets, deep green, 15 - 25 cm, feathered leaf
Осенний окрас	оранжевый, красный, фиолетовый
Цветы	inconspicuous yellow green, in small panicles, April
Плоды	none, fruitless cultivar
Колючки/шипы	None
Ядовитость	неядовитый, обычно
Вид почвы	not too rich in connection with growth rate
Влажность почвы	устойчив к сухим почвам, устойчив к влажным почвам
Мощение	устойчив к мощению
Зона зимостойкости	6a (-23,3 до -20,6 °C)
Устойчивость к ветру	poor in the case of a rapid growth
Прочие виды устойчивости	устойчив к морозам, зона 1 - 6, устойчив к соли для улиц
Применение	аллеи и широкие улицы
Форма	штамбовое дерево, многоствольное дерево
Происхождение	Australia, 1920
Синонимы	Fraxinus a. 'Flame', Fraxinus a. wollastonii

Healthy, but not strongly growing selection with a slightly irregular crown. *F. angustifolia* 'Flame' and 'Wollastonii' are identical to 'Raywood' and can be considered to be synonyms. The main branch grows straight and the structural branches grow diagonally upwards. The bark is grey and at a mature age deeply furrowed, twigs turn from olive green to grey green. 'Raywood' has a closed crown when young, mature trees become half open. The shiny, deep-green leaf consists of 9 - 13 narrow leaflets. These are circa 5 - 10 cm long. In autumn the leaf turns aurantiaceous to deep purple red. In warmer soils and in a hot autumn the autumn colour is much more intense. After the inconspicuous bloom there are no fruits. In fertile soils the growth is often more rapid than in poor soils. Breakage of the branches can be the consequence.