

https://www.vdberk.ru/derevya/toona-sinensis-flamingo/



## Toona sinensis 'Flamingo'



Ширина7-10mКронаoval to broad oval, half-open crownКора и ветвиtwigs copper-coloured and hairy, bark brown-grey with longitudinal splitsЛистparipinnate, 40 - 60 cm, glossy light green, young leaf pink, feathered leafОсенний окрасжелтыйЦветыwhite, in pendent panicles to 50 cm long, June/JulyПлодыwoody capsule with 5 splits containing winged seeds, Ø 2 - 3 cmКолючки/шипыNoneЯдовитостьнеядовитый, обычноВид почвыgood, nutrient-rich soilМощениенеустойчив к мощениюЗона зимостойкости6b (-20,5 до -17,8 °C)Устойчивость к ветруfairlyПрочие виды устойчивостиустойчив к морозам, зона 1 - 6Формаштамбовое дерево, многоствольное дерево		
Кронаoval to broad oval, half-open crownКора и ветвиtwigs copper-coloured and hairy, bark brown-grey with longitudinal splitsЛистparipinnate, 40 - 60 cm, glossy light green, young leaf pink, feathered leafОсенний окрасжелтыйЦветыwhite, in pendent panicles to 50 cm long, June/JulyПлодыwoody capsule with 5 splits containing winged seeds, Ø 2 - 3 cmКолючки/шипыNoneЯдовитостьнеядовитый, обычноВид почвыgood, nutrient-rich soilМощениенеустойчив к мощениюЗона зимостойкостибb (-20,5 до -17,8 °C)Устойчивость к ветруfairlyПрочие виды устойчивостиустойчив к морозам, зона 1 - 6Формаштамбовое дерево, многоствольное дерево	Высота	10 - 15 m
Кора и ветвиtwigs copper-coloured and hairy, bark brown-grey with longitudinal splitsЛистparipinnate, 40 - 60 cm, glossy light green, young leaf pink, feathered leafОсенний окрасжелтыйЦветыwhite, in pendent panicles to 50 cm long, June/JulyПлодыwoody capsule with 5 splits containing winged seeds, Ø 2 - 3 cmКолючки/шипыNoneЯдовитостьнеядовитый, обычноВид почвыgood, nutrient-rich soilМощениенеустойчив к мощениюЗона зимостойкости6b (-20,5 до -17,8 °C)Устойчивость к ветруfairlyПрочие виды устойчивостиустойчив к морозам, зона 1 - 6Формаштамбовое дерево, многоствольное дерево	Ширина	7-10m
Листparipinnate, 40 - 60 cm, glossy light green, young leaf pink, feathered leafОсенний окрасжелтыйЦветыwhite, in pendent panicles to 50 cm long, June/JulyПлодыwoody capsule with 5 splits containing winged seeds, Ø 2 - 3 cmКолючки/шипыNoneЯдовитостьнеядовитый, обычноВид почвыgood, nutrient-rich soilМощениенеустойчив к мощениюЗона зимостойкости6b (-20,5 до -17,8 °C)Устойчивость к ветруfairlyПрочие виды устойчивостиустойчив к морозам, зона 1 - 6Формаштамбовое дерево, многоствольное дерево	Крона	oval to broad oval, half-open crown
Осенний окрас         желтый           Цветы         white, in pendent panicles to 50 cm long, June/July           Плоды         woody capsule with 5 splits containing winged seeds, Ø 2 - 3 cm           Колючки/шипы         None           Ядовитость         неядовитый, обычно           Вид почвы         good, nutrient-rich soil           Мощение         неустойчив к мощению           Зона зимостойкости         6b (-20,5 до -17,8 °C)           Устойчивость к ветру         fairly           Прочие виды устойчивости         устойчив к морозам, зона 1 - 6           Форма         штамбовое дерево, многоствольное дерево	Кора и ветви	twigs copper-coloured and hairy, bark brown-grey with longitudinal splits
Цветыwhite, in pendent panicles to 50 cm long, June/JulyПлодыwoody capsule with 5 splits containing winged seeds, Ø 2 - 3 cmКолючки/шипыNoneЯдовитостьнеядовитый, обычноВид почвыgood, nutrient-rich soilМощениенеустойчив к мощениюЗона зимостойкости6b (-20,5 до -17,8 °C)Устойчивость к ветруfairlyПрочие виды устойчивостиустойчив к морозам, зона 1 - 6Формаштамбовое дерево, многоствольное дерево	Лист	paripinnate, 40 - 60 cm, glossy light green, young leaf pink, feathered leaf
Плодыwoody capsule with 5 splits containing winged seeds, Ø 2 - 3 cmКолючки/шипыNoneЯдовитостьнеядовитый, обычноВид почвыgood, nutrient-rich soilМощениенеустойчив к мощениюЗона зимостойкости6b (-20,5 до -17,8 °C)Устойчивость к ветруfairlyПрочие виды устойчивостиустойчив к морозам, зона 1 - 6Формаштамбовое дерево, многоствольное дерево	Осенний окрас	желтый
Колючки/шипы         None           Ядовитость         неядовитый, обычно           Вид почвы         good, nutrient-rich soil           Мощение         неустойчив к мощению           Зона зимостойкости         6b (-20,5 до -17,8 °C)           Устойчивость к ветру         fairly           Прочие виды устойчивости         устойчив к морозам, зона 1 - 6           Форма         штамбовое дерево, многоствольное дерево	Цветы	white, in pendent panicles to 50 cm long, June/July
Ядовитость         неядовитый, обычно           Вид почвы         good, nutrient-rich soil           Мощение         неустойчив к мощению           Зона зимостойкости         6b (-20,5 до -17,8 °C)           Устойчивость к ветру         fairly           Прочие виды устойчивости         устойчив к морозам, зона 1 - 6           Форма         штамбовое дерево, многоствольное дерево	Плоды	woody capsule with 5 splits containing winged seeds, Ø 2 - 3 cm
Вид почвы         good, nutrient-rich soil           Мощение         неустойчив к мощению           Зона зимостойкости         6b (-20,5 до -17,8 °C)           Устойчивость к ветру         fairly           Прочие виды устойчивости         устойчив к морозам, зона 1 - 6           Форма         штамбовое дерево, многоствольное дерево	Колючки/шипы	None
Мощение         неустойчив к мощению           Зона зимостойкости         6b (-20,5 до -17,8 °C)           Устойчивость к ветру         fairly           Прочие виды устойчивости         устойчив к морозам, зона 1 - 6           Форма         штамбовое дерево, многоствольное дерево	Ядовитость	неядовитый, обычно
Зона зимостойкости       6b (-20,5 до -17,8 °C)         Устойчивость к ветру       fairly         Прочие виды устойчивости       устойчив к морозам, зона 1 - 6         Форма       штамбовое дерево, многоствольное дерево	Вид почвы	good, nutrient-rich soil
Устойчивость к ветру         fairly           Прочие виды устойчивости         устойчив к морозам, зона 1 - 6           Форма         штамбовое дерево, многоствольное дерево	Мощение	неустойчив к мощению
Прочие виды устойчивости устойчив к морозам, зона 1 - 6 Форма штамбовое дерево, многоствольное дерево	Зона зимостойкости	6b (-20,5 до -17,8 °C)
Форма штамбовое дерево, многоствольное дерево	Устойчивость к ветру	fairly
	Прочие виды устойчивости	устойчив к морозам, зона 1 - 6
Происхождение Australia, pre-1930	Форма	штамбовое дерево, многоствольное дерево
	Происхождение	Australia, pre-1930

Particularly striking medium-size tree growing to 10 to 15 m. Initially the tree grows slenderly upwards and has a columnar crown. At a later stage the crown spreads. The young twigs are copper-coloured and hairy. The mature bark is grey-brown with longitudinal splits later. When damaged, the bark, branches and leaves smell unpleasant. The large, paripinnate leaf consists of 20 - 26 leaf segments. These are the same shape as the species. On emerging, they are intense orange-pink, turning greenish-yellow and eventually glossy, light green. In autumn the leaf turns yellow. The small, equally unpleasant smelling flowers appear in large panicles. After the blossom, woody capsules form containing winged seeds. The flowers and fruits only appear in hot summers. A special park tree or solitary.